

Vaccination, faites le point avec vos patients seniors

**RECOMMANDATIONS VACCINALES
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES (≥ 65 ANS)¹**



Fiches patients détachables
« Mon calendrier mémo de
vaccination senior (≥ 65 ans) »

Vaccination, faites le point avec vos patients seniors

RECOMMANDATIONS VACCINALES CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES (≥ 65 ANS)¹



Fiche mémo ci-dessous
à compléter et remettre
à vos patients

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- **Grippe**
Pour les personnes ≥ 65 ans → 1 dose annuelle.
- **Diphthérie, tétanos et poliomyélite (rappels dTP)**
Pour les personnes ≥ 65 ans → 1 dose tous les 10 ans (65 ans, 75 ans, 85 ans...).
- **Zona**
Pour les personnes de 65 à 74 ans révolus → 1 dose unique (vaccin contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées).
- **Covid-19**
Pour les personnes ≥ 65 ans → Les recommandations pourraient être amenées à évoluer en fonction du contexte épidémiologique et des nouvelles informations sur les vaccins, les professionnels sont invités à consulter régulièrement le site du ministère en charge de la santé pour connaître les publics ciblés par la vaccination, les recommandations générales et particulières, ainsi que les schémas vaccinaux à jour.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- **Coqueluche (rappel dTcaP)**
Pour les personnes ≥ 65 ans en situation de cocooning*, non vaccinées depuis l'enfance ou antérieurement vaccinées à l'âge adulte depuis plus de 10 ans → 1 dose unique de dTcaP (délai minimal d'1 mois entre 1 dose de dTP et 1 dose de dTcaP).
- **Pneumocoque**
Pour les personnes ≥ 65 ans à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque, immunodéprimées (ex. asplénie, hyposplénie, transplanté...)** ou non immunodéprimées porteuses d'une maladie sous-jacente prédisposant à la survenue d'infection à pneumocoque (ex. insuffisance cardiaque ou rénale, diabète non équilibré par le simple régime, BPCO...)** :
 - Non vaccinés antérieurement → 1 dose de VPC13, suivie d'1 dose de VPP23 au moins 8 semaines plus tard.
 - Vaccinés depuis plus d'un an avec VPP23 → 1 dose de VPC13, suivie d'1 dose VPP23 avec un délai ≥ 5 ans après l'injection du dernier VPP23.
 - Vaccinés antérieurement avec la séquence VPC13-VPP23 → 1 dose de VPP23 avec un délai ≥ 5 ans après l'injection du dernier VPP23.
- **Hépatite A**
Pour les personnes ≥ 65 ans exposées à un risque particulier**** (si la personne est née avant 1945, une sérologie préalable est fortement recommandée à la recherche d'anticorps témoins d'une immunité ancienne) → 2 doses à 6 mois d'intervalle.

BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive. dTP : Vaccin combiné diphthérie, tétanos et poliomyélite avec des doses réduites d'anatoxine diphthérique (d). dTcaP : Vaccin combiné diphthérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d'anatoxine diphthérique (d) et d'antigènes coquelucheux (ca). VPC13 : Vaccin pneumococcoque conjugué 13-valent. VPP23 : Vaccin pneumococcoque polysidique non conjugué 23-valent.

* Adultes ayant un projet parental, parents et fratrie et toute personne susceptible d'être en contact étroit et durable avec le futur nourrisson au cours de ses 6 premiers mois. Ceci concerne notamment les grands-parents.

** Personnes immunodéprimées (aspléniques ou hypospléniques incluant les drépanocytoses majeures ; atteintes de déficits immunitaires héréditaires ; infectées par le VIH ; tumeur solide ou hémopathie maligne ; transplantées ou en attente de transplantation d'organe solide ; greffées de cellules souches hématopoïétiques ; traitées par immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie pour une maladie auto-immune ou inflammatoire chronique ; atteintes de syndrome néphrotique).






*** Personnes porteuses d'une maladie sous-jacente prédisposant à la survenue d'infection à pneumocoque : cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque ; insuffisance respiratoire chronique, bronchopneumopathie obstructive, emphysème ; asthme sévère sous traitement continu ; insuffisance rénale ; hépatopathie chronique d'origine alcoolique ou non ; diabète non équilibré par le simple régime ; patients présentant une brèche ostéo-méningée, porteurs d'un implant cochléaire ou candidats à une implantation cochléaire).

**** Personnes exposées à des risques particuliers : patients infectés chroniques par le virus de l'hépatite B ou porteurs d'une maladie chronique du foie (notamment due au virus de l'hépatite C ou à une consommation excessive d'alcool) ; hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.



MON CALENDRIER MÉMO DE VACCINATION SENIOR (≥ 65 ANS)¹

JE PENSE PRÉVENTION
JE PENSE VACCINATION 

	Pour quelle maladie ? 	Pour qui ? 	Suis-je concerné ? 	Quels vaccins ? 	Mes vaccinations réalisées 
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES	Grippe saisonnière	Grippe saisonnière	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vaccin antigrippal 1 dose tous les ans	<input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../.....
	Diphtérie	Toutes les personnes ≥ 65 ans	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Rappels du vaccin dTP 1 dose tous les 10 ans aux âges fixes de 65 ans, 75 ans, 85 ans...	<input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../.....
	Tétanos				
	Poliomyélite				
	Zona	Toutes les personnes entre 65 et 74 ans	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vaccin contre le zona* 1 dose unique	<input type="checkbox"/>/...../.....
	Covid-19	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../.....

* Vaccin vivant atténué contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées¹.



MON CALENDRIER MÉMO DE VACCINATION SENIOR (≥ 65 ANS)¹

JE PENSE PRÉVENTION
JE PENSE VACCINATION

	Pour quelle maladie ?	Pour qui ?	Suis-je concerné ?	Quels vaccins ?	Mes vaccinations réalisées
RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES	Coqueluche	Toutes les personnes ≥ 65 ans en situation de « cocooning »*	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Rappel du vaccin dTcaP 1 dose unique	<input type="checkbox"/>/...../.....
	Pneumocoque	Toutes les personnes ≥ 65 ans à <u>risque</u> **	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vaccin pneumococcique 1 à 2 doses selon le schéma vaccinal	<input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../.....
	Hépatite A	Toutes les personnes ≥ 65 ans exposées à un <u>risque particulier</u> ***	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vaccin contre l'hépatite A 2 doses à 6 mois d'intervalle	<input type="checkbox"/>/...../..... <input type="checkbox"/>/...../.....

* Personnes susceptibles d'être en contact étroit et durable avec un futur nourrisson au cours de ses 6 premiers mois (ex. : grands-parents)¹.

** Personnes non immunodéprimées porteuses d'une maladie sous-jacente ou personnes immunodéprimées¹.

*** Patients infectés chroniques par le virus de l'hépatite B ou porteurs d'une maladie chronique du foie ; hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes¹.

¹ Ministère des Solidarités et de la Santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2021. Avril 2021.



 **JE PENSE PRÉVENTION**
JE PENSE VACCINATION 



Parlons **Vaccins**

Pour en savoir plus sur les recommandations vaccinales,
consultez le calendrier vaccinal interactif sur
www.parlons-vaccins.fr ou flashez le QR code ci-dessous :



PP-VAC-FRA-0632 - Mai 2021 - Pfizer - Société par actions simplifiée au capital de 47 570 € - Siège social 23-25 avenue
du Docteur Lannelongue - 75014 Paris 433 623 550 RCS Paris - Locataire-gérant de Pfizer Holding France.

1. Ministère des Solidarités et de la Santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2021. Avril 2021.

